



ANFIBI



ESPLORA

**Parco Pineta**  
di Appiano Gentile e di Tradate



# ANFIBI

## NEL PARCO PINETA

### 1° Parte: gli anuri



# Rana verde minore (*Pelophylax esculentus*)

Cm 10 (maschi)  
←→  
Cm 12 (femmine)



verde – marrone con riga dorsale  
chiara e due pliche laterali



# Rana verde minore (*Pelophylax esculentus*)



**Cibo:** zanzare, mosche, vespe, farfalle



**Ambienti:** Stagni solegggiati, paludi, canali, dove passa tutta la bella stagione

# Rana agile (*Rana dalmatina*)

Cm 6,5 (maschi)  
←→  
Cm 8 (femmine)



**Bruna con gola chiara ed una macchia scura dietro gli occhi. Muso appuntito, lunghe zampe posteriori e pliche sul dorso.**



# Rana agile (*Rana dalmatina*)



**Cibo:** zanzare, mosche, ragni e cavallette.



**Ambienti:** Boschi di latifoglie o misti.

Depone le uova in pozze d'acqua ombrose o anche in pozzanghere.

# Uova e girini di rana

**Uova rana verde:** Da 400 a 5000 in ogni ovatura. Si schiudono in una settimana.


G F M A M G L A S O N D

**Uova rana rossa:** Da 600 a 2000 in ogni ovatura, si schiudono in 2-4 settimane, a seconda della temperatura dell'acqua.

G F M A M G L A S O N D



**ammassi gelatinosi  
galleggianti**




**girini marroni con pancia chiara  
si trasformano in 2-3 mesi.**




# Rospo comune (*Bufo bufo*)

Cm 10 (maschi)  
←→  
Cm 20 (femmine)




**Colore bruno uniforme, con pelle verrucosa, muso arrotondato, ghiandole parotidi**

# Rospo comune (*Bufo bufo*)



**Cibo:** formiche, coleotteri e ragni.



**Ambienti:** Boschi di latifoglie o misti.

**Depone le uova in stagni grandi e profondi.**

# Uova e girini rospo

**Uova di rospo: fino a 5000, in cordoni gelatinosi ancorati alla vegetazione**

**Girini di rospo: neri**

G F M A M G L A S O N D





# Pelobate fosco (*Pelobates fuscus*)

G F M A M G L A S O N D



Cm 6,5 (maschi)  
←————→  
Cm 8 (femmine)

Molto raro



Da biancastro – grigio a bruno,  
a macchie e odore di aglio.

**Girini: molto grossi (8-18 cm) Uova in cordoni**

# Pelobate fosco (*Pelobates fuscus*)

G F M A M G L A S O N D



**Cibo: coleotteri**



**Ambienti: boschi**

**abitudini fossorie (passa molto tempo interrato)**

**depone le uova in grandi stagni, paludi, canali**

# LIFE 19-NAT/IT/000883 Insubricus



ANFIBI – GLI ANURI

# Raganella (*Hyla intermedia*)

G F M A M G L A S O N D



Cm 5



**Verde brillante, con banda marrone sui fianchi e dita dotate di ventose.**



**Uova: 700-1000 in piccoli ammassi ancorati alla vegetazione**


**Girini: dorati**

# Raganella (*Hyla intermedia*)

G F M A M G L A S O N D



**Cibo:** ragni, coleotteri, zanzare e altri insetti



**Ambienti:** Boscaglia, dove caccia arrampicandosi sulle piante.

Depone le uova in pozze piccole, calde e poco profonde.



ANFIBI

ESPLORA



# ANFIBI

## NEL PARCO PINETA

1° Parte: gli anuri



Foto: A. Berlusconi, P.E. Bergò, P. Casale, Christian Fischer e archivio Parco

Disegni: P. Casale



ANFIBI



ESPLORA


Parco Pineta  
di Appiano Gentile e di Tradate



# ANFIBI

## NEL PARCO PINETA

### 2° Parte: gli urodeli



# Tritone crestato (*Triturus carnifex*)

G F M A M G L A S O N D



Cm 17





Dorso scuro con punti neri sui fianchi e ventre giallo-arancio con macchie scure

Nel periodo riproduttivo i maschi hanno una cresta dentata sul dorso e sulla coda.




**Uova:** circa 200, deposte tra marzo e maggio singolarmente.





**Larve:** chiare a macchiette scure, con branchie evidenti e zampe.

# Tritone crestato (*Triturus cristatus*)



**Cibo:** piccoli invertebrati sia terrestri che acquatici



**Ambienti:** zone umide medio-grandi ricche di vegetazione acquatica

Dopo la riproduzione può condurre vita terrestre nei pressi dello stagno

# Tritone punteggiato (*Lissotriton vulgaris*)

Cm 11  
←→

**Uova:** 200-300, deposte tra marzo e maggio e avvolte singolarmente in una foglia

**Larve:** chiare con fine macchiettatura, branchie evidenti e zampe.




**Marrone, con macchie scure e piccola cresta dorsale. Ventre giallo-arancio.**

G F M A M G L A S O N D

# Tritone punteggiato (*Lissotriton vulgaris*)



**Cibo:** piccoli invertebrati sia terrestri che acquatici, larve di anfi



**Ambienti:** varie zone umide, ma ricche di vegetazione acquatica

Dopo la riproduzione conduce vita terrestre nei pressi dello stagno

# Salamandra *Salamandra salamandra*

G F M A M G L A S O N D



Cm 30



**Nera lucente con macchie gialle**

**Non fanno uova,  
depongono 10-30  
larve in acqua.**




**Larve: Scure con  
una macchietta  
gialla alla base di  
ciascuna zampa.**




# Salamandra *Salamandra salamandra*

G F M A M G L A S O N D



**Cibo: invertebrati.**



**Ambienti: boschi di latifoglie**

**Depone le larve in torrenti con acqua pulita**

# ANFIBI

## NEL PARCO PINETA

### 2° Parte: gli urodeli

